

PRESTOPRO

ÚJ!

Igen korai

Igen korai és korai éréscsoportba határán érő, középmagas fajta. Szára elágazásra hajlamos. Korai virágzású virágszíne lila. Köldöke sárga. A hüvelye világos, magja lapított gömb formájú, kifejezetten nagy méretű, ennek köszönhetően kiemelkedő termőképességű. 2017-ben a szalántai fajtatorban 4 t/ha, szigetvári vetőmag-előállításban 4,34 t/ha volt a termésátlaga. Decs községben aszályos körülmények között 3 t/ha termésátlaggal takarítható be.

Felhasználás: takarmány/étkezés célú
EMT: 190–210 g

Vetésidő: április 25. – május 15.
Javasolt tőszám: 520–580 ezer tő/ha
Fehérjetartalom: 41 % felett
Olajtartalom: 17–19 %

Agromag TIPP

Rövid tenyészideje ellenére magas termőképességű.

Korlátozott mennyiségben érhető el!

EMA

Korai

Korai érésű fajta, akár június elején is vethető, korai vetés esetén korán betakarítható. Tenyészideje 132–142 nap. Szára középmagas (80–105 cm) és kemény, többszörösen elágazik, szárszilárdsága kiváló. Alsó hüvely magassága: 18–20 cm. Terméspotenciálja igen magas, optimális körülmények között 5 tonnát meghaladó termésre képes. 2016-ban az iregszemcsei fajtatorban 5,1 t/ha termésátlagot hozott, amelyet 2017-ben kedvezőtlenebb időjárási viszonyok mellett megismételt. Alkalmazkodóképessége széleskörű, az eltérő talaj és időjárási körülményeket jól viseli. A főbb betegségekkel szemben kielégítő ellenállósággal rendelkezik.

Felhasználás: takarmány célú
EMT: 170–190 g

Tenyészideje: 132–142 nap
Vetésidő: április 25. – május 5.
Javasolt tőszám: 600–650 ezer tő/ha
Fehérjetartalom: 39–41%
Olajtartalom: 20–22%

Agromag TIPP

Akár június elején is vethető, korai vetés esetén korán betakarítható.

SEKA

Korai

Indeterminált növekedésű fajta, az átlagnál magasabb (110–115 cm). Jó szárszilárdsággal rendelkezik. Alsó hüvely magassága 20–24 cm. A szemek és a köldök színe világossárga. Terméspotenciálja magas, kedvező körülmények között termésátlaga meghaladja az 5 t/ha-t. A piacvezetőkkel azonos termésátlagra képes némileg korábbi éréssel. Tenyészideje 136–145 nap. 2017-ben az iregszemcsei bemutatósorban 4,9 t/ha, a kamutiban öntözött körülmények között 4,72 t/ha termésátlagot produkált. Baranyában üzemi körülmények között elérte a 4,5 tonna termést hektáronként. Kiváló alkalmazkodóképességgel és jó betegséggellenálló-képességgel rendelkezik, peronoszpórára különösen ellenálló.

Felhasználás: takarmány/étkezési célú
EMT: 160–170 g

Tenyészideje: 136–145 nap
Vetési idő: április 15. – 30.
Javasolt tőszám: 580–600 ezer tő/ha
Fehérjetartalom: 39–41%
Olajtartalom: 20–22%



BORBÁLA

ÚJ!  Középerésű

Féldeterminált növekedésű, kiváló szárszilárdságú növény. Korai virágzású, virágszíne lila, a hüvelye világos. Magja nagy, lapított gömb formájú, köldöke világos. Kiegyensúlyozott, kiemelkedő termésre képes. Korán betakarítható fajta, tenyészideje 140–150 nap. 2017-ben kisparcellás kísérletünkben Dalmandon 4,63 t/ha-os kiváló termésátlagot ért el, Decs községben vetőmag-előállításban 3,47 t/ha termésátlagot produkált. A szélsőséges körülményeket jól tűri. Hazai nemesítésű, magas fehérjetartalmú szója. Étkezési célra kiváló, ezért kíméletes, gondos betakarítása meghatározza értékét. Kórokozókkal és kártevőkkel szemben jól ellenáll.

Felhasználás: takarmány/étkezési célú
EMT: 200–205 g
Tenyészideje: 140–150 nap
Vetési idő: április 25. – 30.
Javasolt tőszám: 450–500 ezer tő/ha
Fehérjetartalom: 41 % felett
Olajtartalom: 17–19%

Agromag TIPP

Étkezési célra kiváló, ezért kíméletes, gondos betakarítása meghatározza értékét.

Korlátozott mennyiségben érhető el!

IKA

Középerésű

A szár magassága száraz években 70 cm körüli, kedvező időjárás mellett 90–105 cm is lehet. A főhajtása akár 14–15 termékeny szintet is képes hozni, rajtuk 4–6 hüvellyel. Alsó hüvely magassága 15–20 cm. Könnyen és alacsony veszteséggel takarítható be. Horvátországban több mint egy évtizede piacvezető fajta, Baranyában is jelentős termőterülete van. Nem tipikus szójatermesztő régiókban is jelentős vetésterülettel bír. Jó az évjáratbiztonsága, több évjáratban is 5 t/ha-t meghaladó eredménye volt. Kiváló a szárazságtűrése. Fehérpenészes szárrothadással szemben jó toleranciával rendelkezik, jó a gyomelnyomó képessége. Vízleadása gyors.

Felhasználás: takarmány/étkezési célú
EMT: 160–180 g
Tenyészideje: 142–152 nap
Vetési idő: április 15. – 30.
Javasolt tőszám: 580–620 ezer tő/ha
Fehérjetartalom: 39–40 %
Olajtartalom: 20–22 %

Agromag TIPP

Könnyen és alacsony veszteséggel takarítható be.

TERRAPRO

Középerésű

Szára közepes magasságú, 85–100 cm, az alsó hüvely magassága 15–17 cm. Magjának mérete közepes. Kiemelkedő termőképességű. 2017-ben Baranya megyében vetőmag-előállításban 3,76 t/ha lett a termésátlaga, Dalmandon kisparcellás fajtakísérletben 4,71 t/ha termésátlagot produkált. Kiváló az állóképessége és jó a stressztűrő képessége. Könnyen és alacsony veszteséggel takarítható be. Tenyészideje 143–153 nap.

Felhasználás: takarmány célú
EMT: 170–195 g
Tenyészideje: 143–153 nap
Vetésidő: április 15. – 30.
Javasolt tőszám: 500–600 ezer tő/ha
Fehérjetartalom: 37–38%
Olajtartalom: 21–23%

Korlátozott mennyiségben érhető el!

